

定期予防接種スケジュール

定期予防接種は、市が委託している指定医療機関で一年間を通して無料で接種できます。(個別接種です。)

予防接種を受ける際は、各医療機関によって接種日や接種時間が違いますので必ず確認してからお出かけください。望ましい接種時期に受けられなかった方も早めに計画をたてて受けましょう。

※予防接種についてのご相談やお問い合わせは、弘前市保健センターにおよせください。

ワクチン	1 か 月	2 か 月	3 か 月	4 か 月	5 か 月	6 か 月	7 か 月	8 か 月	9 か 月	1 歳	2 歳	3 歳	4 歳	5 歳	6 歳	7 歳	8 歳	9 歳	10 歳	11 歳	12 歳	13 歳	14 歳	15 歳	16 歳	17 歳	18 歳	19 歳	備 考	
B型肝炎		↓																											27日以上の間隔をあけて2回目接種。3回目は1回目接種から139日以上(20週以上)の感覚をあけて3回目接種を行う。	
ヒブ		↓																											標準として生後2か月～7か月未満で開始し27～56日の間隔で3回。3回の接種後7か月～13か月までに追加1回。接種開始が生後7か月～1歳未満は、27～56日の間隔で2回。2回の接種後7か月～13か月までに追加1回。接種開始が1歳～5歳未満は1回。	
小児用肺炎球菌		↓																											標準として生後2か月～7か月未満で開始し27日以上の間隔で3回。3回後60日以上の間隔で1歳～1歳3か月までに追加1回。ただし2回目3回目は1歳未満までに終える。それを越えた場合は、追加接種で行う。接種開始が生後7か月～1歳未満は、27日以上の間隔で2回。2回後60日以上の間隔で1歳以降に追加1回。ただし2回目は1歳未満までに終える。それを越えた場合は、追加接種で行う。接種開始が1歳の場合は60日間以上の間隔で2回接種。2歳以上は1回接種	
4種混合 (ジフテリア(D) 百日ぜき(P) 破傷風(T) 不活化ポリオ(IPV)) 3種混合(DPT) ポリオ(IPV)	1期	↓	↓	↓																									生後3か月～7歳6か月未満	生後3か月になったら受けましょう。 標準として1期初回は、20日～56日までの間隔をおいて3回。 追加は、3回目後1年～1年6か月の間に接種。
2種混合 (ジフテリア・破傷風)	2期																												3種混合1期(または4種混合1期)を終了したお子さんが対象 1期の基礎免疫が不十分な場合は医師と相談しましょう	
B C G			↓																										望ましい接種は生後5か月～生後8か月未満	
麻しん風しん混合 又は 麻しん・風しん	1期																												1期は1歳になったらすぐ接種	
	2期																												5～7歳未満で翌年小学校入学の子 *幼稚園などの年長児の時 (平成24年4月2日～平成25年4月1日生まれの子)	4月から6月の期間にできるだけ接種(定期接種期間は4月1日～3月31日までです。)
水痘																													標準として1回目の接種は、生後12か月から15か月に達するまでに接種し、6か月から12か月の間隔をおいて2回目を行う。	
日本脳炎	1期																												3歳になったら1期初回2回 (標準として6日～28日までの間隔をおいて受けましょう。) 1期追加接種は、初回2回終了後おおむね1年の間隔をおいて受けましょう。	平成17年度の積極的動員差し控えにより接種機会を逃した平成10年4月2日から平成19年4月1日生まれの方で4回の接種が終わっていない方は、弘前市保健センターへお問い合わせください。
	2期																												日本脳炎1期を終了したお子さんが対象です。 1期の基礎免疫が不十分な場合は医師と相談しましょう。	
子宮頸がん予防																													ワクチンには2価と4価の2種類があり最初に使ったワクチンで最後まで接種 2価は3回(0, 1, 6か月後)・4価は3回(0, 2, 6か月後)いずれも筋肉内注射	現在積極的なすめは差し控えています。

↓ 接種

対象年齢

望ましい接種時期

※予防接種を受けることができる医療機関は20～23ページをご参照ください。